VII Jornada Nacional de Clínica Virtual
“Prof. Dr. José Baudilio Jardines Méndez in Memoriam”

I Jornada Nacional de Presentación de Casos Clínicos de Ortodoncia y Anatomía Patológica
II Jornada Nacional Científica Estudiantil de Presentación de Casos Clínicos

Alteraciones hematológicas en pacientes oncológicos

Rolando Dario Rosales Campos

Estudiante de 4^{to} año de Medicina. Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Alumno Ayudante de Cirugía General. Correo electrónico:

rolandodario@nauta.cu Orcid: <http://orcid.org/0000-0003-2711-9004>

Puntos clave

La anemia en pacientes con cáncer.

Anemia de los trastornos crónicos

Uso los agentes eritropoyéticos en el tratamiento
de la anemia

Fenómenos tromboembólicos, y agentes
eritropoyéticos

Experiencia cubana con ior EPOICM

Puntos clave

Neutropenia y neutrofilia en pacientes con cáncer

Factores de crecimiento mieloide

Papel de las plaquetas en el desarrollo del cáncer

Déficit plaquetarios como trastornos paraneoplásicos

Hematopoyesis

producción y el mantenimiento adecuado de los componentes formes de la sangre

Médula ósea

HPSC en estado inactivo

Estado de flujo constante

Restauramiento de la homeostasis

Respuesta a diversos estímulos externos

Produce y libera 6 mil mill. Células/kg/d

Las células madre y progenitoras hematopoyéticas (HPSC) repueblan estos elementos

Fisiopatología de los trastornos hematológicos en el cáncer

- 1 Respuesta predominantemente inflamatoria de la enfermedad maligna
- 2 Naturaleza no selectiva de la mayoría de los agentes antineoplásicos
- 3 Efectos mielotóxicos o mielosupresores

Mecanismo de acción: efectos directos del ADN que pueden inhibir la progresión del ciclo celular en varias fases o causar daño directo al ADN, resultando en apoptosis o deterioro del crecimiento y proliferación de células progenitoras

Usualmente **dependiente de la dosis**, la vía y la frecuencia de administración

2 millones de eritrocitos por segundo

Vida útil aproximada de 120 días

Pérdida del 1% del total de glóbulos rojos a diario

Más de 1010 nuevas células por hora

< 12,0 g / dL en mujeres

< 13,0 g / dL en hombres

30% - 90%

ANEMIA

Disminución de la masa de glóbulos rojos

GENERAL ▶ fatiga, cansancio, falta de concentración, mareos, dolor de cabeza, somnolencia

MUSCULAR ▶ debilidad, falta de fuerza y resistencia, calambres nocturnos

RESPIRATORIO ▶ respiración corta y dificultosa, sensación de falta de aire

INTESTINAL ▶ heces muy oscuras

OJOS ▶ palidez en el interior y color amarillo en la esclerótida

CORAZÓN ▶ dolor en el pecho, taquicardias, arritmias, palpitaciones

PIEL ▶ palidez en la piel, mucosas y encías, manos y pies fríos, uñas quebradizas

BAZO ▶ aumento de tamaño

Mecanismos fisiopatológicos

- disminución de la producción de glóbulos rojos (hipoproliferación),
- aumento de la destrucción de glóbulos rojos o
- pérdida de sangre.

Causas

- Quimioterapia
- Anemia de los trastornos crónicos
- Deficiencia de hierro
- Pérdida de sangre
- Infiltración tumoral
- Deficiencias nutricionales
- Alteración de los niveles de EPO

Necesidad de evaluación de laboratorio

Papel de la eritropoyetina en el paciente oncológico

La eritropoyetina (EPO) es una citocina endógena cuyo receptor es el EPOR ubicado en los progenitores eritroides de la médula ósea

Producida en el 90 % por el intersticio renal, y el resto lo produce el hígado y otros sitios, como el bazo y los testículos

Estimula el ciclo celular de los progenitores eritroides inactivos hacia la maduración terminal y la supervivencia de los progenitores posteriores

Regulada por los niveles tisulares de oxígeno tisular

Niveles normales de EPO: <math><5 - 25 \text{ U / L}</math>

Factor inducible por hipoxia (HIF) es la principal vía de señalización de la eritropoyesis, el cual regula transcripcionalmente múltiples genes involucrados en la supervivencia, proliferación y diferenciación de los glóbulos rojos

En pacientes oncológicos la regulación de la EPO está alterada por el aumento de citocinas proinflamatorias que inhiben la producción de EPO, denominada anemia de enfermedad crónica (AoCD).

Anemia inducida por quimioterapia

Encuesta Europea sobre Anemia por Cáncer:

De los 14.520 pacientes con cáncer casi uno de cada tres (31,7%) pacientes que aún no habían recibido tratamiento presentaban anemia

62,7% pacientes tratados con quimioterapia y desarrollaron anemia

La prevalencia de anemia fue del 50,5% en los pacientes que recibieron quimioterapia en comparación con los que recibieron quimiorradioterapia (43,5%) o radiación sola (28,7%)

39,3% de los pacientes tenían niveles de hemoglobina por debajo de 10 g / dL

Hemólisis

Dstrucción de los glóbulos rojos

Anemia hemolítica
microangiopática

las membranas de las células de los glóbulos rojos son propensas a romperse a través de un esfuerzo cortante mecánico a través de un proceso no inmunomediado

Trombocitopenia = Microangiopatía Trombótica

Asociadas al cáncer o inducidas por la quimioterapia

Los cánceres de estómago, pulmón, mama y próstata son los tumores sólidos más comúnmente asociados con MAT

Prácticamente indistinguibles clínicamente de la púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) y el síndrome urémico hemolítico (SUH)

Tratamiento quimioterápico dirigido a la neoplasia maligna

Agentes quimioterápicos inductores de MAHA y TMA

Pérdida de sangre

Causas

- Sangrado del tejido tumoral necrótico
- Permeabilidad microvascular asociada al tumor
- Invasión vascular directa por el tumor
- Afecciones comórbidas: gastritis y úlcera péptica

Sangrado agudo

Los niveles de hemoglobina, el hematocrito y los resultados de los estudios de hierro pueden ser falsamente normales o casi normales porque aún no se han producido los mecanismos compensatorios

1

Transfusiones
de sangre

2

Hidratación intensiva
de líquidos

3

Estudios de
diagnóstico

Transfusión sanguínea

Indicaciones

- Signos o síntomas relacionados con la anemia con niveles altos de Hb
- Sangrado agudo y activo
- Anemia crónica estable por debajo de 7 g/dl

Riesgos asociados

- Transmisión de infecciones virales
- Contaminación bacteriana de productos sanguíneos
- Tromboembolismo venoso
- Mortalidad hospitalaria
- Reacciones hemolíticas o anafilaxia
- Lesión pulmonar aguda relacionada con transfusiones (TRALI).
- Reacciones transfusionales hemolíticas retardadas

Agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE)

Tratamiento de las anemias relacionadas con el cáncer como sustitutos exógenos de la EPO

Minimizan el número de transfusiones de sangre y mejora las medidas de calidad de vida, como el nivel de energía, y actividades de la vida diaria

No está exento de riesgos

Supervivencia libre de progresión

Supervivencia global

- Estímulo de la angiogénesis mediante activación de la cascada de coagulación

- Estimular el crecimiento de las células tumorales
- Disminuir la apoptosis de las células tumorales
- Aumentar la resistencia a la terapia

Aunque EPO-R existe en muchos tejidos no hematopoyéticos, y varias células tumorales; sin embargo, los medios para cuantificar la EPO-R carecen de especificidad y, por el momento, no hay ningún anticuerpo válido para detectar la presencia de EPO-R

RESULTADOS NO CONCLUYENTES

Table 1. Erythropoiesis-stimulating agent studies with a negative signal on outcome.

Patients (n)	Setting	Primary end point	Inclusion Hb	Target Hb	Achieved Hb ^a	OS HR (95% CI)
<i>Radiotherapy studies</i>						
351	Head and neck cancer Radiotherapy	Locoregional progression-free survival	<12 g/dl (F) <13 g/dl (M)	≥14 g/dl (F) ≥15 g/dl (M)	NA	1.62 (1.22–2.14)
522	Head and neck cancer Radiotherapy	Locoregional failure	≤14.5 g/dl	14–15.5 g/dl	NA	1.44 (1.06–1.96)
<i>Anemia of cancer studies</i>						
70	Non-small-cell lung cancer Anemia of cancer	Quality of life	≤12 g/dl	12–14 g/dl	NA	1.84 (1.01–3.35)
989	Miscellaneous cancers Anemia of cancer	RBC transfusions	≤11 g/dl	12–13 g/dl	10.6 g/dl	1.30 (1.07–1.57)
<i>Chemotherapy studies</i>						
344	Nonmyeloid malignancy Chemotherapy	RBC transfusions	≤11 g/dl	13–14 g/dl (F) 13–15 g/dl (M)	11 g/dl	1.37 (1.02–1.83)
939	Metastatic breast cancer Chemotherapy	12-month OS	≤13 g/dl	12–14 g/dl	12.9 g/dl	1.37 (NA)
733	Breast cancer Neoadjuvant chemotherapy	RFS and OS	<13 g/dl	12.5–13 g/dl	13.1 g/dl	RFS: 1.33 (0.99–1.79) OS: 1.42 (0.93–2.17)
114	Cervical cancer Chemoradiotherapy	Progression-free survival	<14 g/dl ^b	12–14 g/dl	12.7 g/dl	1.06 (0.58–1.91)

^aValues as reported in US FDA briefing and in FDA package insert [29].

^bRBC transfusion given first if Hb <12 g/dl.

F: Female; Hb: Hemoglobin; HR: Hazard ratio for active arm versus placebo; M: Male; NA: Not available; OS: Overall survival; RBC: Red blood cell; RFS: Relapse-free survival.

ior[®] EpoCIM

Eritropoyetina humana recombinante

Contiene 165 aminoácidos

34. 000 daltons

Contiene una secuencia de aminoácidos idéntica a la de la eritropoyetina natural

Obtenida por tecnología de ADN recombinante

Tratamiento de la anemia en pacientes oncológicos con quimioterapia

Suplementación con hierro

El hierro es necesario para la síntesis del grupo hemo

Se deben realizar estudios para determinar el estado del hierro

La respuesta al tratamiento con hierro oral es más lenta en comparación con el hierro intravenoso.

Las formulaciones intravenosas conllevan el riesgo de una reacción alérgica, que va desde la urticaria hasta la anafilaxia

Tratamiento antes del inicio de la quimioterapia mielosupresora

Suplementación con hierro

Tratamiento inicial de la

Deficiencia absoluta

→ Ferritina → <30 ng / ml
→ Saturación de transferrina → <20%

Sin AEE

Reevaluación → 4 semanas → Si no mejora → Añadir AEE

Deficiencia relativa

→ Ferritina → 30-500 ng / ml
→ Saturación de transferrina → 20-50 %

Eritrocitosis

Producción
ectópica
de EPO

↑
Producción
de
eritrocitos

Hematocrito

3%

Carcinoma renal

10%

Hepatomas

15%

Hemangioblastomas
cerebelosos

> 52 %

> 48 %

NEUTROPENIA

A large, detailed illustration of a neutrophil, a type of white blood cell. It features a multi-lobed nucleus stained in shades of pink and purple, and a light blue cytoplasm containing numerous small, dark purple granules. The cell is shown in a slightly irregular, rounded shape.

Degree of neutropenia

Mild neutropenia

ANC 1000- 1500

Moderate neutropenia

ANC 500- 999

Severe neutropenia

ANC 100- 499

ANC, absolute neutrophil count

NEUTROPENIA FEBRIL

Emergencia oncológica
Requiere hospitalización
Antibióticos intravenosos

80% De los pacientes que reciben quimioterapia

10- 50% De los pacientes con tumores sólidos

Una sola temperatura oral o axilar de $\geq 38,3^{\circ}$ celsius (C) (101° fahrenheit [F]) o una temperatura $\geq 38,0^{\circ}$ C ($100,4^{\circ}$ F) sostenida durante 60 minutos en un paciente con un ANC $<500 / \mu\text{l}$ (microlitro)

Escalofríos Tos Disnea
Dolor de las superficies mucosas y encía

Síntomas

Fisiopatología

Neutropenia relacionada con la quimioterapia

- Agentes administrados
- Intensidad
- Edad
- Exposición previa

ALTO RIESGO DE INFECCIONES

Neutropenia de grado 3-4

Tratamiento

Infiltración tumoral → No responde al ↓
Causada por quimioterapia → Factor de crecimiento mieloide
No Antibióticos

FACTORES DE CRECIMIENTO MIELOIDE

Glicoproteínas

→ Estimulan

Proliferación

Diferenciación

Movilización

Células madres hematopoyéticas

Factor estimulante de colonias de granulocitos

↓ MORTALIDAD

Factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos

- Filgastrim
- Tbo-filgastrim
- Filgastrim-sndz
- Pelfisgastrim
- Trasplante de médula ósea
- Movilización de células sanguíneas periféricas
- Manejo de la neutropenia crónica severa
- Leucemia mieloide crónica

- Sargramostim

NO RECOMENDADO

ior[®] LeukoCIM

G-CSF recombinante
metionilo altamente purificada de E. coli expresada en G-CSF humano
175 residuos de aminoácidos

Table 2. Distribution of episodes by indication vs. the main variable of response

Next chemotherapy cycle on time?	Indication		Total
	Prophylaxis	Treatment	
	No. (%)	No. (%)	
Yes	32 (84.2 %)*	46 (80.7 %)*	78
No	6 (15.8 %)	11 (19.3 %)	17
Total	38	57	95

* Pearson χ^2 $p = 0.662$

Efficacy and safety of ior[®] LeukoCIM (G-CSF) in patients with neutropenia after chemotherapy

Indicaciones de factores de crecimiento mieloides

Profilaxis primaria

prevenir un primer episodio de FN y mantener la dosis del régimen de quimioterapia y la intensidad de los ciclos posteriores

Riesgo de desarrollar NF > 20 %

Profilaxis secundaria

- edad mayor de 65 años
- tratamiento previo de quimioterapia o radioterapia
- neutropenia persistente
- afectación de la médula ósea
- cirugía reciente o heridas abiertas
- bilirrubina total superior a 2,0

Complemento terapéutico de la terapia con antibióticos

- aclaramiento de creatinina <50
- estado funcional
- Comorbilidades
- bajo índice de masa corporal

Duración del tratamiento con G-CSF

Todos los ciclos **VS.** Solo al inicio

Incidencia de NF

10%

36%

Profilaxis secundaria

1

Desarrollo de NF de un ciclo anterior

2

Desarrollo de neutropenia

Evento neutropénico o NF

Evento neutropénico o NF

Intención curativa

Intención paliativa

Intención paliativa

Uso previo de G-CSF

Sin uso previo de G-CSF

Mantenimiento de la dosis

Posibilidad de supervivencia

Sin posibilidad de supervivencia

Disminución de dosis de Qx

Agregar G-CSF

Agregar G-CSF

Agregar G-CSF

Disminución de dosis de Qx

Granulocitosis

recuento $>8\ 000$ células/ μL

30% de los pacientes con tumores sólidos tiene granulocitosis

Causas:

- Infección
- Necrosis tumoral
- Administración de glucocorticoides
- Producción tumoral de:
 - Factor estimulante de las colonias de granulocitos
 - Factor estimulante de las colonias de granulocitos-macrófagos
 - Interleucina 6
- Idiopática

40% Cáncer pulmonar y digestivo

20% Cáncer de mama

30% Tumor cerebral y cáncer de ovario

20% Enfermedad de Hodgkin

10% Carcinoma renal

Eosinofilia

Por la producción de IL-5 que estimula la producción de eosinófilos

1% de los pacientes con cáncer

Generalmente asintomática

10% Linfomas

3% Cáncer de pulmón

Cáncer cervicouterino, digestivo, renal y de mama

> 5 000 cel/ μ L

- Disnea
- Sibilancias
- Infiltrados pulmonares difusos

Tratamiento del cáncer
Glucocorticoides orales o inhalados
Antagonistas IL-5 ???

TROMBOCITOPENIA

recuento de plaquetas por debajo de 100×10^9 por litro

IL-1
C-KIT
Citocinas

TPO
IL-11

Proliferación
Diferenciación

Megacariocito

- Grado 1: 75,000 - 100,000
- Grado 2: 50,000 - 75,000
- Grado 3: 25,000 - 50,000
- Grado 4: < 25,000

plaq/microl

Efectos
citotóxicos
directos

Apoptosis de los
progenitores
megacariocíticos

Trombocitopenia inducida por quimioterapia **10%** Tumores sólidos
< 75,000

Platino

57%

18-29%

Secuestro
esplénico

Volumen total de plaquetas normal
Número de plaquetas circulantes ↓

Síndrome de
obstrucción
sinusoidal

Hipertensión portal
Esplenomegalia

Secuestro de
plaquetas

Transfusión de plaquetas

profilaxis para prevenir complicaciones hemorrágicas
en presencia de hemorragia activa
 20×10^9 por litro o menos

Trombopoyetina

se están investigando para la trombocitopenia relacionada con el
cáncer y la quimioterapia, agentes que imitan las acciones de la
TPO endógena

- TPO de longitud completa (rhtpo)
- TPO truncada pegilada (peg-rhumgdf)
- Construcción quimérica de ligando de IL-3 y mpl

Citocinas trombopoyéticas

IL-1, IL-3, IL-6 e IL-11, se han investigado como agentes potenciales para el tratamiento de la trombocitopenia inducida por quimioterapia

Citocinas trombopoyéticas

Se unen al receptor
Aun en estudio

TROMBOCITOSIS

recuento de plaquetas $>400\ 000$ células/ μL

IL-6

Estimula la formación
de plaquetas

Trombopoyetina

40%

Cáncer pulmonar y digestivo

20%

Cánceres de mama, endometrio
y ovario

10%

Linfomas

Signo de mal pronóstico

TROMBOFLEBITIS

Trombosis venosa profunda
Embolia pulmonar

Enfermedades trombóticas

Más frecuentes en el cáncer

Trombosis venosa periférica

Síndrome de Trousseau

Factores de riesgo

Inmovilización Cirugía Catéteres intravenosos SAAFL
Obstrucción mecánica tumoral Agentes antineoplásicos

Manifestaciones clínicas

Dolor o edema en la pierna
Dolor a la palpación
Hipertermia
Hiperemia local.

Disnea
Dolor torácico
Síncope
Taquicardia
Cianosis
Hipotensión

- Pulmón
- Páncreas
- Tubo digestivo
- Mama
- Ovario
- Aparato genitourinario
- Linfomas
- Tumores cerebrales

Diagnóstico

- Pletismografía de impedancia
- Ecografía con compresión de las venas de ambas piernas
- Venografía
- Radiografía de tórax
- Electrocardiograma
- Gasometría arterial
- Gammagrafía de ventilación – perfusión
- Angiografía pulmonar

Tratamiento

- Heparina IV no fraccionada
- Heparina de bajo peso molecular
- Warfarina
- Filtro de greenfield
- Medias/ pantalones neumáticos
- Ácido acetilsalicílico

Conclusiones

- Las causas de anomalías hematológicas en pacientes con tumores sólidos son muy variables y el tratamiento depende en gran medida de la etiología.
- La mielosupresión relacionada con la quimioterapia y otros efectos adversos continúa siendo uno de los principales factores contribuyentes a la aparición de complicaciones relacionadas con el tratamiento del cáncer, así como a la evaluación tórpida,
- Las células tumorales, disponen de un gran arsenal de proteínas, con las cuales se enmascaran de la respuesta inmune e inducen la modificación de la actividad celular a distancia, mediante la liberación al torrente sanguíneo de péptidos y proteínas con función hormonal, con un peso relevante por su acción sobre la médula ósea y su dinámica.

Conclusiones

- Aunque el desarrollo de factores de crecimiento mieloide ha mejorado la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la neutropenia, el papel de los AEE ha sido más limitado debido a problemas de seguridad, y la transfusión sigue siendo la principal intervención terapéutica para la anemia.
- La transfusión es también la intervención principal para la trombocitopenia asociada a la quimioterapia, y el agente trombopoyético óptimo sigue siendo difícil de alcanzar, y aún se necesitan investigaciones continuas sobre opciones ampliadas para mitigar los efectos de la quimioterapia y otras anomalías hematológicas relacionadas con el cáncer.
- La introducción de biosimilares es una opción que amplía el desarrollo de la investigaciones en el campo de los factores de crecimiento hematopoyéticos, como prometedores resultados clínicos, necesarios en una nueva revolución en el tratamiento de las condiciones inducidas por el cáncer y su tratamiento.